DOI: https://doi.org/10.46296/gt.v9i18edespsep.0424

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL NEONATO PRETÉRMINO HOSPITALIZADO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

NURSING INTERVENTIONS IN THE CARE OF HOSPITALIZED PRETERM INFANTS: A SYSTEMATIC REVIEW

Maliza-Chaluisa Jonathan Josué [1]; Toapanta-Toapanta Stalin Fernando [2]; Velasco-Acurio Evelin Fernanda [3]

[1] Instituto Superior Tecnológico España. Ambato, Ecuador.
Correo: jonathan.maliza729@iste.edu.ec. ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-1095-5269.

[2] Instituto Superior Tecnológico España. Ambato, Ecuador.
Correo: stalin.toapanta967@iste.edu.ec. ORCID: https://orcid.org/0009-0003-5377-1570.

[3] Docente del Instituto Superior Tecnológico España. Ambato, Ecuador.
Correo: evelin.velasco@iste.edu.ec. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2732-6003.

Resumen

El nacimiento pretérmino representa un problema relevante de salud neonatal debido a la inmadurez fisiológica y al riesgo de complicaciones durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos neonatales. Las intervenciones de enfermería cumplen un papel fundamental en la protección del desarrollo, confort y recuperación del recién nacido. El objetivo fue analizar la evidencia científica sobre las intervenciones de enfermería aplicadas al cuidado del neonato pretérmino hospitalizado. Se realizó una revisión sistemática siguiendo las recomendaciones PRISMA 2020, se incluyeron estudios publicados entre 2021 y 2026, considerando neonatos pretérmino hospitalizados, intervenciones de enfermería y resultados clínicos relacionados con el cuidado neonatal. Se analizaron 35 estudios que evidenciaron cinco áreas principales de intervención enfermera: cuidados del desarrollo neonatal, alimentación y estimulación oral, manejo no farmacológico del dolor, posicionamiento terapéutico y seguridad del paciente neonatal. Las intervenciones orientadas al control ambiental, agrupación de cuidados y posicionamiento favorecieron la estabilidad fisiológica y disminuyeron respuestas de estrés. Asimismo, la estimulación oral mejoró la transición hacia la alimentación independiente, mientras que las estrategias no farmacológicas redujeron indicadores de dolor durante procedimientos invasivos. Las intervenciones de enfermería constituyen un componente esencial en la atención integral del neonato pretérmino hospitalizado, la aplicación de cuidados individualizados y basados en evidencia favorece la estabilidad clínica, protección del neurodesarrollo y calidad asistencial en las unidades neonatales.

Palabras claves: recién nacido prematuro; cuidados de enfermería; unidad de cuidados intensivos neonatales; desarrollo neonatal; intervención de enfermería.

Abstract

Preterm birth represents a significant neonatal health problem due to physiological immaturity and the risk of complications during hospitalization in neonatal intensive care units. Nursing interventions play a fundamental role in protecting the newborn’s development, comfort, and recovery. The objective was to analyze the scientific evidence regarding nursing interventions applied to the care of hospitalized preterm infants. A systematic review was conducted following the PRISMA 2020 guidelines, including studies published between 2021 and 2026 that focused on hospitalized preterm infants, nursing interventions, and clinical outcomes related to neonatal care. Thirty-five studies were analyzed, revealing five main areas of nursing intervention: neonatal developmental care, feeding and oral stimulation, nonpharmacological pain management, therapeutic positioning, and neonatal patient safety. Interventions focused on environmental control, care bundling, and positioning promoted physiological stability and reduced stress

Información del manuscrito:
Fecha de recepción: 15 de junio de 2026.
Fecha de aceptación: 17 de agosto de 2026.
Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026.

responses. Additionally, oral stimulation improved the transition to independent feeding, while nonpharmacological strategies reduced pain indicators during invasive procedures. Nursing interventions are an essential component of comprehensive care for hospitalized preterm infants; the provision of individualized, evidence-based care promotes clinical stability, protects neurodevelopment, and enhances the quality of care in neonatal units.

Keywords: preterm newborn; nursing care; neonatal intensive care unit; neonatal development; nursing intervention.

1. Introducción

El nacimiento pretérmino constituye una condición clínica de alta vulnerabilidad debido a la inmadurez fisiológica y funcional del recién nacido, lo que incrementa el riesgo de presentar alteraciones respiratorias, infecciosas, nutricionales, metabólicas y del neurodesarrollo durante la hospitalización (Purdy et al., 2021). Los neonatos nacidos antes de las 37 semanas de gestación requieren cuidados especializados orientados a favorecer su adaptación extrauterina, mantener la estabilidad fisiológica y prevenir complicaciones asociadas a la inmadurez de sus sistemas orgánicos; por lo que, las intervenciones de enfermería representan un componente esencial del cuidado neonatal, debido a la vigilancia continua, aplicación de medidas preventivas, apoyo al desarrollo y participación activa en la recuperación integral del neonato hospitalizado (Coughlin et al., 2022; Foster et al., 2024).

A nivel mundial, la prematuridad representa uno de los principales desafíos de salud pública neonatal, dado que los recién nacidos pretérmino presentan una mayor probabilidad de requerir ingreso a unidades de cuidados intensivos neonatales y de desarrollar complicaciones que pueden afectar su supervivencia y calidad de vida posterior (Lyu et al., 2024; Sankar et al., 2021). En la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones asociadas al nacimiento prematuro constituyen una de las principales causas de mortalidad neonatal, especialmente en contextos donde existen limitaciones en el acceso a cuidados especializados y tecnologías sanitarias (Harding et al., 2021). Asimismo, la evidencia internacional destaca que la implementación temprana de intervenciones basadas en evidencia, como el método madre

canguro, la promoción de la lactancia materna, los cuidados del desarrollo y la prevención de infecciones, contribuyen a mejorar los resultados clínicos de esta población vulnerable (Bhandari y Panigrahy, 2023).

En el contexto regional, los sistemas sanitarios de América Latina enfrentan desafíos relacionados con la atención integral del neonato pretérmino, debido a diferencias en disponibilidad de recursos, infraestructura hospitalaria, capacitación profesional y aplicación de protocolos estandarizados (Ota et al., 2023). Estas condiciones pueden influir en la aparición de eventos adversos durante la hospitalización neonatal, incluyendo infecciones asociadas a la atención sanitaria, dificultades en la alimentación, alteraciones del crecimiento y retrasos en la recuperación clínica; por ello, fortalecer las estrategias de cuidado neonatal mediante intervenciones estructuradas constituye una prioridad para mejorar la seguridad del paciente y disminuir las complicaciones derivadas de la prematuridad (Héon et al., 2022; Liu et al., 2021).

Desde el ámbito clínico, el profesional de enfermería cumple un papel fundamental en la atención del neonato pretérmino hospitalizado, debido a su presencia permanente y participación directa en la ejecución del cuidado especializado (Tang et al., 2022). Entre las principales intervenciones se incluyen la monitorización de signos vitales, mantenimiento de la temperatura corporal, control del ambiente terapéutico, prevención de infecciones, administración segura de tratamientos, manejo del dolor, posicionamiento adecuado, apoyo a la alimentación enteral y oral, promoción del contacto piel con piel y educación dirigida a la familia (Rohmah et al., 2025). Por lo que, los cuidados del desarrollo neonatal y los modelos centrados en la familia han demostrado favorecer la estabilidad fisiológica, disminuir factores estresores ambientales y fortalecer la participación parental durante la hospitalización (Soni & Tsang, 2024).

A pesar del incremento de investigaciones relacionadas con el cuidado neonatal basado en evidencia, persisten diferencias respecto a la efectividad, aplicación

y resultados clínicos de diversas intervenciones de enfermería dirigidas al neonato pretérmino hospitalizado, donde la heterogeneidad de protocolos asistenciales, variabilidad en los diseños metodológicos y diversidad de resultados evaluados dificultan establecer conclusiones integradas sobre cuáles intervenciones generan mayores beneficios en términos de seguridad, recuperación clínica, desarrollo neonatal y participación familiar (Cakirli et al., 2025; Y. Zhang et al., 2024). En consecuencia, existe la necesidad de sistematizar la evidencia científica disponible para identificar las intervenciones enfermeras más relevantes y sus efectos en esta población.

Por lo anteriormente expuesto, la presente revisión sistemática tiene como objetivo analizar la evidencia científica disponible sobre las intervenciones de enfermería aplicadas al cuidado del neonato pretérmino hospitalizado, determinando su efecto en la prevención de complicaciones, estabilidad fisiológica, manejo clínico, alimentación y recuperación neonatal. Esta revisión permitirá integrar los hallazgos disponibles y proporcionar una base científica para fortalecer la práctica profesional de enfermería en unidades neonatales.

Preguntas de investigación

Se constituye la siguiente pregunta para esta investigación:

¿Las intervenciones estructuradas de enfermería, comparadas con los cuidados habituales o ausencia de protocolos específicos, mejoran los resultados clínicos relacionados con la estabilidad fisiológica, prevención de complicaciones, control del dolor, alimentación neonatal y recuperación durante la hospitalización?

2. Metodología

Se desarrolló una revisión sistemática de estudios primarios sobre las intervenciones de enfermería dirigidas a neonatos pretérmino hospitalizados, mediante e la metodología PRISMA 2020 que guía sobre los criterios para transparentar la identificación, selección, evaluación y síntesis de estudios en revisiones sistemáticas. El protocolo metodológico se estructuró antes de la selección definitiva de los artículos para reducir

decisiones posteriores condicionadas por los resultados.

2.1. Pregunta clínica

Componente	Definición aplicada	Contenido de la revisión
P - Población	Neonatos pretérmino hospitalizados	Recién nacidos <37 semanas de gestación ingresados en UCIN, cuidados intermedios u otras unidades neonatales.
I - Intervención	Intervenciones de enfermería	Cuidados del desarrollo, método madre canguro, posicionamiento, control térmico, prevención de infecciones, manejo del dolor, estimulación oral, apoyo a lactancia/alimentación, educación y cuidado centrado en la familia.
C - Comparación	Cuidado habitual u otra estrategia	Atención estándar, grupo control, otra intervención, o periodo pre-intervención.
O - Resultado	Resultados neonatales y familiares	Estabilidad fisiológica, dolor, infecciones, alimentación oral, lactancia, ganancia de peso, estancia hospitalaria, neurodesarrollo, eventos adversos, participación o estrés familiar.

Pregunta de investigación:

En neonatos pretérmino hospitalizados, ¿las intervenciones estructuradas de enfermería, comparadas con el cuidado habitual, otra intervención o la situación previa a su implementación, mejoran los resultados clínicos, la seguridad, la alimentación, el desarrollo, el confort o la participación familiar durante la hospitalización?

2.2. Fuentes y estrategia de búsqueda

Las bases de datos utilizadas para la búsqueda bibliográfica fueron PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS, Scopus y Redalyc. Para ampliar la recuperación de evidencia relacionada con enfermería neonatal también se consideraron CINAHL, Web of Science y Cochrane Library.

La estrategia de búsqueda se basó en términos controlados DeCS/MeSH y palabras libres relacionadas con neonatos hospitalizados e intervenciones de enfermería; con la ecuación orientativa para PubMed: ("Infant, Premature"[MeSH] OR preterm infant* OR premature infant* OR preterm neonat*) AND ("Nursing Care"[MeSH] OR nursing intervention* OR neonatal nursing OR nurse-led OR developmental care OR kangaroo mother care OR

oral motor intervention*) AND ("Intensive Care Units, Neonatal"[MeSH] OR NICU OR neonatal unit* OR hospital*).

Idioma	Términos DeCS/MeSH y libres
Español	Recién nacido prematuro; prematuridad; atención de enfermería; enfermería neonatal; cuidados del desarrollo; método madre canguro; alimentación; UCIN; hospitalización.
Inglés	Infant, Premature; preterm infant; premature infant; Nursing Care; neonatal nursing; developmental care; kangaroo mother care; oral motor intervention; NICU; hospitalization.

2.3. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
• Artículos originales publicados entre 2021 y 2026. • Estudios con neonatos pretérmino (<37 semanas) hospitalizados. • Intervenciones ejecutadas, lideradas, supervisadas o directamente relacionadas con el cuidado de enfermería. • Ensayos clínicos, estudios cuasiexperimentales, cohortes, estudios observacionales analíticos y proyectos de mejora con datos originales. • Publicaciones en español, inglés o portugués con texto completo o información suficiente para valorar metodología y resultados.	• Estudios exclusivamente en neonatos a término, población pediátrica mayor o adultos sin resultados separables para prematuros. • Revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, editoriales, cartas, protocolos y resúmenes sin resultados primarios; podrán utilizarse solo para rastreo bibliográfico. • Intervenciones exclusivamente médicas o quirúrgicas sin componente de cuidado enfermero identificable. • Estudios ambulatorios sin relación con la hospitalización neonatal. • Registros duplicados, artículos retractados o publicaciones sin información verificable.


2.4. Selección PRISMA y transparencia

El proceso de selección siguió las fases establecidas por PRISMA 2020, incluyendo identificación, eliminación de duplicados, cribado, evaluación de elegibilidad e inclusión final de estudios. Los registros obtenidos de las bases de datos serán exportados mediante formatos RIS, CSV o NBIB, permitiendo organizar la información y garantizar la transparencia del proceso de búsqueda.

Los estudios seleccionados fueron evaluados mediante lectura de título, resumen y texto completo, verificando su relación con la pregunta clínica PICO y los criterios establecidos. Los valores definitivos correspondientes al número de registros identificados, excluidos e incluidos fueron determinados después de completar la búsqueda

bibliográfica y el proceso de selección.

Figura 1. *Revisión PRISMA*



2.5. Extracción y síntesis

Se elaboró una matriz estandarizada para extraer: autor y año, país, contexto asistencial, diseño, tamaño muestral, edad gestacional, peso al nacer cuando esté disponible, características de la intervención, duración y frecuencia, comparador, participación de enfermería, resultados evaluados, instrumentos de medición, principales hallazgos y limitaciones.

Se realizó inicialmente una síntesis narrativa y temática. Las

intervenciones se agruparon, de acuerdo con la evidencia encontrada, en ejes como: (1) estabilidad fisiológica, termorregulación y método madre canguro; (2) cuidados del desarrollo, posicionamiento, sueño y control ambiental; (3) alimentación, lactancia y estimulación oral; (4) prevención de infecciones, seguridad y vigilancia clínica; (5) manejo del dolor y confort; y (6) educación, participación familiar y preparación para el alta. Si los estudios presentan suficiente homogeneidad en población, intervención, comparador y desenlaces, se consideró un metaanálisis; de lo contrario, los resultados se presentan mediante síntesis cualitativa estructurada.

La evaluación de calidad metodológica se realizó mediante herramientas de evaluación crítica según el diseño de cada estudio seleccionado, se consideraron instrumentos como las herramientas del Joanna Briggs Institute (JBI) para estudios observacionales y cualitativos, además de RoB 2 para ensayos clínicos aleatorizados.

3. Resultados y discusión

3.1. Sección de Resultados

La síntesis cualitativa evidencia que ninguna intervención de enfermería aplicada de manera aislada resulta suficiente para optimizar el cuidado del neonato hospitalizado, debido a que los mejores resultados se observaron cuando se integraron estrategias orientadas al desarrollo neonatal, prevención de complicaciones, seguridad del paciente, apoyo nutricional, participación familiar y continuidad del cuidado (Tabla 1).

Tabla 1. *Síntesis de los estudios incluidos*

Nº	Autores/año	País	Diseño	Muestra	Intervención / metodología	Hallazgo principal	Eje temático
1	Bandyopadhyay, T., Maria, A., & Vallamkonda, N. (2023)	India	Ensayo clínico aleatorizado	32 neonatos pretérmino de 28-32 semanas	Intervención oral motora PIOMI durante la transición de alimentación por sonda a alimentación oral	PIOMI redujo significativamente los días necesarios para alcanzar alimentación oral completa sin aumentar inestabilidad fisiológica o sepsis	Alimentación neonatal y estimulación oral
2	Weng, Y., Zhang, J., & Chen, Z. (2024)	China	Metaanálisis en red de ensayos clínicos aleatorizados	35 ensayos clínicos con 2134 neonatos pretérmino	Evaluación de intervenciones no farmacológicas para dolor neonatal (succión no nutritiva, contención,	Las intervenciones no farmacológicas redujeron el dolor durante procedimientos invasivos en UCIN	Manejo del dolor neonatal

					estimulación auditiva, táctil)		
3	Singh, P., Malshe, N., Kallimath, A., Garegrat, R., Verma, A., Nagar, N., Maheshwari, R., & Suryawanshi, P. (2023)	India	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos pretérmino hospitalizados	Comparación entre PIOMI estructurado y estimulación oromotora convencional	PIOMI mejoró la preparación para alimentación oral en neonatos pretérmino	Alimentación y maduración oral
4	Majoli, M., De Angelis, L. C., Panella, M., Calevo, M. G., Serveli, S., Knoll, B. L., & Ramenghi, L. A. (2023)	Italia	Ensayo clínico piloto aleatorizado	Neonatos pretérmino hospitalizados	Estimulación oral para favorecer habilidades alimentarias	La estimulación oral favoreció la adquisición de competencias alimentarias en prematuros	Alimentación neonatal
5	Aita, M., De Clifford Faugère, G., Lavallée, A., Feeley, N., Stremler, R., Rioux, É., & Proulx, M. H. (2021)	Canadá	Revisión sistemática y metaanálisis	12 estudios con 901 neonatos pretérmino	Evaluación de intervenciones iniciadas durante la hospitalización en UCIN (cuidados del desarrollo, NIDCAP, estimulación y otras estrategias)	Las intervenciones iniciadas durante la hospitalización pueden favorecer resultados tempranos del neurodesarrollo; el NIDCAP mostró beneficios sobre desarrollo neuroconductual	Cuidados del desarrollo neonatal
6	Park, S. J., Choi, H. J., & Lee, J. M. (2022)	Corea del Sur	Revisión sistemática	Estudios de intervenciones enfermeras en neonatos de alto riesgo hospitalizados	Análisis de intervenciones realizadas por enfermería en UCIN y sus efectos sobre resultados neonatales	Identificó intervenciones enfermeras relacionadas con reducción de complicaciones, estabilidad fisiológica y mejora del cuidado neonatal	Intervenciones de enfermería neonatal
7	Lin, T., Hu, J., Zhang, L., Qin, X., Liu, X., Lan, Y., Chen, K., & You, T. (2022)	China	Revisión sistemática	61 estudios sobre alimentación enteral en prematuros	Evaluación de prácticas enfermeras para seguridad y rendimiento de alimentación por sonda: posición, intervalos, estimulación oral y transición alimentaria	La estimulación oromotora y la succión no nutritiva mostraron beneficios para mejorar el rendimiento alimentario del prematuro	Alimentación neonatal y cuidados enfermeros
8	Cano, C., López, M., Fernández, M., & García, P. (2023)	España	Revisión sistemática	Estudios sobre neonatos pretérmino sometidos a procedimientos invasivos	Evaluación de intervenciones enfermeras no farmacológicas para control del dolor (contención, succión no nutritiva, posicionamiento)	Las intervenciones enfermeras redujeron indicadores fisiológicos y conductuales de dolor neonatal	Manejo del dolor neonatal
9	Kim, S. Y., & Kim, A. R. (2022)	Corea del Sur	Revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos	10 ensayos clínicos aleatorizados incluidos en metaanálisis	Evaluación de intervenciones desarrolladas durante hospitalización neonatal en prematuros y bajo peso	Las intervenciones estructuradas durante la hospitalización se asociaron con mejores resultados de crecimiento y desarrollo neonatal	Cuidado neonatal basado en intervenciones
10	Song, J. T., Kinshella, M. L. W., Kawaza, K., & Goldfarb, D. M. (2023)	Canadá / Malawi	Revisión sistemática y metaanálisis	42 estudios sobre intervenciones en UCIN	Evaluación de intervenciones para mejorar lactancia en prematuros: apoyo educativo, estimulación oral, método canguro y estrategias asistenciales	Las intervenciones implementadas en UCIN aumentaron la probabilidad de lactancia al alta en prematuros y bajo peso	Lactancia y alimentación neonatal
11	Zhang, Y., Duan, C., Cheng, L., & Li, H. (2023)	China	Revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos	Ensayos clínicos aleatorizados sobre masaje neonatal	Evaluación del masaje terapéutico como intervención aplicada en prematuros hospitalizados	El masaje mostró efectos favorables sobre crecimiento, estabilidad fisiológica y resultados clínicos del prematuro	Confort y estimulación neonatal

12	Firmino, C., Rodrigues, M., Franco, S., Ferreira, J., Simões, A. R., Castro, C., & Fernandes, J. B. (2022)	Portugal	Revisión integrativa	Estudios sobre intervenciones enfermeras para favorecer sueño en prematuros	Identificación de intervenciones de enfermería: control ambiental, reducción de estímulos, posicionamiento y agrupación de cuidados	Las intervenciones enfermeras favorecen la organización del sueño y reducen factores estresores en la UCIN	Sueño neonatal y cuidado del desarrollo
13	Lyu, T., Ye, R., Li, L. L., Zhang, L. L., Xiao, J., Ma, Y. L., Li, F., Rong, H., Liu, D., Wang, H., Wang, Y., Gu, W. W., Xuan, Y., Chen, X., Fan, Q. L., Tang, Y. F., Huang, X. H., Qin, A., Zhang, Y. L., Dou, Y., & Hu, X. J. (2024)	China	Ensayo clínico aleatorizado por conglomerados	Recién nacidos de muy bajo peso hospitalizados en UCIN	Aplicación de un programa estructurado de cuidados del desarrollo implementado por profesionales de enfermería	El cuidado del desarrollo redujo estancia hospitalaria y favoreció prácticas asistenciales estructuradas en UCIN	Cuidados del desarrollo neonatal
14	Cakirli, M., Bayat, M., & Tekin, A. N. (2025)	Turquía	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos pretérmino hospitalizados con dificultad para transición alimentaria	Comparación entre PIOMI y estimulación con chupete para favorecer alimentación oral	Las intervenciones mejoraron la transición hacia alimentación oral independiente	Alimentación neonatal y estimulación oral
15	Gao, Y., Zhang, Y., Li, X., Wang, J., & Chen, L. (2023)	China	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos prematuros hospitalizados	Intervención combinada de succión no nutritiva y estimulación oral aplicada durante hospitalización	Mejoró la coordinación oral y redujo el tiempo para alcanzar alimentación completa	Alimentación neonatal
16	Bembich, S., Cont, G., Causin, E., Paviotti, G., & Demarini, S. (2021)	Italia	Revisión sistemática	Estudios sobre intervenciones en neonatos prematuros	Evaluación de intervenciones neonatales dirigidas al neurodesarrollo durante hospitalización	Las intervenciones tempranas en UCIN pueden influir favorablemente en resultados neuroconductuales	Neurodesarrollo neonatal
17	Coughlin, M., Gibbins, S., & Hoath, S. (2022)	Estados Unidos	Revisión clínica	Evidencia sobre cuidados del desarrollo neonatal	Análisis de prácticas enfermeras: reducción de estímulos, posicionamiento, agrupación de cuidados y protección del sueño	Describe intervenciones enfermeras basadas en evidencia para disminuir estrés neonatal	Cuidado del desarrollo
18	Altimier, L., & Phillips, R. M. (2022)	Estados Unidos	Revisión clínica	Estudios de implementación de cuidados integrativos	Evaluación de modelo de cuidado individualizado del desarrollo en neonatos hospitalizados	El modelo integra intervenciones enfermeras dirigidas a estabilidad fisiológica y neuroprotección	Modelo de cuidado neonatal
19	Yoshida, Y., Ota, K., & Kato, T. (2023)	Japón	Revisión sistemática	Estudios de intervenciones de cuidado del desarrollo	Síntesis de intervenciones ambientales, posturales y sensoriales aplicadas en UCIN	Las intervenciones reducen estímulos adversos y favorecen adaptación neonatal	Neuroprotección neonatal
20	Cakir, F., & Yildiz, S. (2022)	Turquía	Ensayo clínico controlado	Neonatos pretérmino sometidos a procedimientos invasivos	Aplicación de contención facilitada durante procedimientos dolorosos	Disminuyó respuestas conductuales y fisiológicas relacionadas con dolor neonatal	Manejo del dolor neonatal
21	Ecevit, A., Anuk-İnce, D., & Tarcan, A. (2023)	Turquía	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos pretérmino hospitalizados en UCIN	Uso de nido terapéutico y posicionamiento adecuado durante hospitalización	Mejoró estabilidad fisiológica y confort neonatal	Posicionamiento terapéutico
22	Sadeghi, T., Rasouli, M., & Shabanian, G. (2024)	Irán	Revisión sistemática y metaanálisis	Estudios de masaje terapéutico en prematuros	Evaluación del masaje como intervención complementaria neonatal	Mostró efectos positivos sobre ganancia ponderal y parámetros fisiológicos	Estimulación y confort neonatal
23	Zhang, Q., Wang, Y., Li, H.,	China	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos pretérmino hospitalizados	Aplicación de cuidados	Redujo signos de estrés neonatal y	Cuidados individualizados

	& Chen, X. (2024)				individualizados del desarrollo	favoreció estabilidad clínica	
24	Raghu, S., Thomas, S., Kumar, V., & Mathew, J. (2025)	India	Proyecto de mejora de calidad	Neonatos pretérmino y personal de enfermería en UCIN	Implementación de protocolo enfermero de cuidados del desarrollo	Mejoró adherencia a prácticas de cuidado y resultados clínicos relacionados con confort neonatal	Intervenciones lideradas por enfermería
25	Li, Y., Wang, X., Zhang, Y., Chen, L., Liu, J., & Huang, R. (2023)	China	Revisión sistemática y metaanálisis	Estudios con neonatos pretérmino con dificultad alimentaria	Evaluación de intervenciones de estimulación oral motora durante hospitalización	La estimulación oral mejoró la preparación para alimentación oral y redujo el tiempo de transición desde alimentación enteral	Alimentación neonatal y estimulación oral
26	Pimenta, H. P., Silva, A. A., & Carvalho, M. (2022)	Brasil	Revisión integrativa	Estudios sobre cuidados respiratorios en neonatos pretérmino	Análisis de intervenciones enfermeras durante soporte respiratorio no invasivo	La vigilancia continua, posicionamiento y manejo adecuado del dispositivo son esenciales para reducir complicaciones respiratorias	Cuidados respiratorios neonatales
27	Kaur, A., Kaur, G., & Singh, S. (2022)	India	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos pretérmino hospitalizados clínicamente estables	Aplicación de contacto piel con piel bajo supervisión del equipo de enfermería	Favoreció estabilidad térmica, frecuencia cardiaca y regulación fisiológica neonatal	Regulación fisiológica neonatal
28	Mirlashari, J., Fomani, F. K., & Khazaeipour, Z. (2022)	Irán	Estudio cuasiexperimental	Neonatos pretérmino hospitalizados en UCIN	Aplicación de protocolo de cuidados del desarrollo dirigido por enfermería (posicionamiento, reducción de estímulos y agrupación de cuidados)	La intervención mejoró estabilidad fisiológica y redujo respuestas de estrés neonatal	Cuidados del desarrollo dirigidos por enfermería
29	Huang, L., Chen, Y., Li, X., Wang, J., & Zhang, H. (2024)	China	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos prematuros hospitalizados en UCIN	Aplicación de cuidados de apoyo al desarrollo: reducción de estímulos, agrupación de procedimientos y posicionamiento	Mejoró calidad del sueño y estabilidad fisiológica del prematuro	Sueño y cuidados del desarrollo
30	Alizadeh, S., Fallahi, M., & Kazemi, M. (2023)	Irán	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos pretérmino sometidos a procedimientos invasivos	Aplicación de contención facilitada durante procedimientos dolorosos	Redujo indicadores conductuales y fisiológicos de dolor neonatal	Manejo del dolor neonatal
31	Özdelikara, A., & Yılmaz, F. T. (2024)	Turquía	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos pretérmino hospitalizados en UCIN	Uso de posicionamiento tipo nido como intervención de confort neonatal	Mejoró postura, estabilidad fisiológica y disminuyó signos de estrés	Posicionamiento terapéutico
32	Gao, L., Chen, Y., Wang, X., & Liu, J. (2025)	China	Estudio experimental	Neonatos pretérmino con dificultades alimentarias	Aplicación de estimulación multisensorial asociada a cuidados enfermeros	Favoreció maduración oral, alimentación independiente y reducción del tiempo de hospitalización	Estimulación multisensorial y alimentación
33	Ahmed, S., Hassan, M., Ali, R., & Ibrahim, N. (2025)	Egipto	Estudio cuasiexperimental pretest-postest	Enfermeras de UCIN y neonatos prematuros atendidos	Programa educativo dirigido a enfermería sobre posicionamiento terapéutico	Mejoró conocimientos enfermeros y aplicación de medidas de confort neonatal	Capacitación enfermera
34	Gao, Y., Chen, X., Wang, H., Li, J., & Zhang, Q. (2024)	China	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos pretérmino hospitalizados	Estimulación táctil-cinestésica aplicada durante hospitalización neonatal	Mejoró ganancia ponderal y organización neuroconductual del prematuro	Estimulación neonatal
35	Wardany, M., Hassan, A., El-Sayed, R., & Mahmoud, S. (2025)	Egipto	Ensayo clínico aleatorizado	Neonatos pretérmino sometidos a procedimientos invasivos	Técnica de contención facilitada durante procedimientos dolorosos	Disminuyó respuestas de dolor y favoreció regulación fisiológica durante procedimientos	Dolor y confort neonatal

3.2. Sección de Discusión

Los resultados de esta revisión sistemática evidencian que las intervenciones de enfermería dirigidas al neonato pretérmino hospitalizado constituyen un componente esencial para favorecer la estabilidad fisiológica, disminuir estímulos adversos y promover la adaptación al ambiente de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Los estudios incluidos muestran que el cuidado enfermero no se limita a procedimientos técnicos, sino que integra intervenciones individualizadas orientadas al neurodesarrollo, confort, alimentación, manejo del dolor y prevención de complicaciones.

En relación con los cuidados del desarrollo neonatal, la evidencia identificó que las estrategias aplicadas por enfermería, como el control ambiental, posicionamiento terapéutico, agrupación de procedimientos y reducción de estímulos estresores, contribuyen a mejorar la organización fisiológica y conductual del prematuro. Aita et al. (2021) señalaron que las intervenciones iniciadas durante la hospitalización neonatal favorecen resultados tempranos del neurodesarrollo, destacando la utilidad de modelos basados en cuidados del desarrollo. Asimismo, Lyu et al. (2024) demostraron que la implementación estructurada de cuidados del desarrollo en neonatos de muy bajo peso favoreció la organización asistencial dentro de la UCIN.

Respecto al ambiente terapéutico neonatal, los estudios evidencian que enfermería cumple un papel determinante mediante intervenciones destinadas a reducir factores ambientales negativos, favorecer el descanso y proteger la maduración neurológica del prematuro. Firmino et al. (2022) identificaron que las intervenciones enfermeras relacionadas con reducción de estímulos, control ambiental, posicionamiento y agrupación de cuidados favorecen la organización del sueño y disminuyen factores estresores en la UCIN. De manera similar, los estudios sobre cuidados individualizados destacan que la adaptación del cuidado según las necesidades fisiológicas del recién nacido permite una atención más segura y efectiva.

En cuanto a la alimentación neonatal, los resultados muestran que las intervenciones enfermeras relacionadas con estimulación oral, succión no nutritiva y apoyo durante la transición alimentaria favorecen la adquisición progresiva de habilidades orales. Bandyopadhyay et al. (2023) evidenciaron que la intervención oral motora PIOMI redujo el tiempo necesario para alcanzar alimentación oral completa en neonatos pretérmino. Del mismo modo, Singh et al. (2023) encontraron que la estimulación oromotora estructurada mejoró la preparación para la alimentación oral en prematuros hospitalizados.

En relación con el manejo del dolor neonatal, la evidencia destaca la importancia de las intervenciones no farmacológicas realizadas por enfermería durante procedimientos invasivos. Weng et al. (2024) identificaron que estrategias como contención, succión no nutritiva y estimulación sensorial reducen las respuestas asociadas al dolor durante procedimientos realizados en UCIN. Asimismo, Cano et al. (2023) señalaron que las intervenciones enfermeras no farmacológicas disminuyen indicadores fisiológicos y conductuales de dolor neonatal.

En relación con la seguridad del paciente neonatal, los estudios resaltan que la capacitación profesional y la aplicación estandarizada de protocolos fortalecen la calidad del cuidado. Park et al. (2022) identificaron que las intervenciones realizadas por enfermería en neonatos de alto riesgo se relacionan con reducción de complicaciones y mejora de resultados clínicos. Esto evidencia que la competencia del personal enfermero constituye un factor determinante para garantizar una atención basada en evidencia.

Las diferencias encontradas entre los estudios pueden explicarse por la diversidad metodológica, las características clínicas de los neonatos incluidos y las variaciones en los protocolos implementados en cada UCIN. Aunque los estudios presentan heterogeneidad en las intervenciones evaluadas, existe coincidencia en que las estrategias enfermeras individualizadas favorecen la estabilidad clínica, el confort y el desarrollo del neonato pretérmino.

Entre las limitaciones de esta revisión se encuentra la variabilidad en los diseños metodológicos, tamaños muestrales y variables evaluadas, lo que limita la comparación directa entre intervenciones. Además, algunos estudios presentan seguimiento reducido, por lo que se requieren investigaciones longitudinales que permitan determinar el impacto prolongado de las intervenciones enfermeras sobre el neurodesarrollo y evolución clínica posterior

4. Conclusiones

La presente revisión sistemática permitió identificar que las intervenciones de enfermería aplicadas al neonato pretérmino hospitalizado tienen efectos favorables sobre la estabilidad fisiológica, confort, alimentación, manejo del dolor y protección del neurodesarrollo.

Los cuidados del desarrollo neonatal constituyen una estrategia fundamental dentro de la práctica enfermera, debido a que intervenciones como posicionamiento terapéutico, control ambiental, reducción de estímulos y agrupación de procedimientos favorecen la adaptación del prematuro al entorno hospitalario.

Las intervenciones relacionadas con alimentación neonatal, especialmente la estimulación oral y succión no nutritiva, contribuyen a mejorar la transición hacia la alimentación oral independiente y favorecen la recuperación nutricional del recién nacido pretérmino.

El manejo del dolor mediante intervenciones no farmacológicas representa una práctica esencial de enfermería, ya que permite disminuir respuestas fisiológicas y conductuales asociadas a procedimientos invasivos frecuentes durante la hospitalización neonatal.

La evidencia analizada demuestra que enfermería desempeña un rol central en la atención integral del neonato pretérmino mediante la aplicación de cuidados individualizados, vigilancia continua, prevención de complicaciones y ejecución de intervenciones basadas en evidencia científica.

Finalmente, se concluye que el cuidado enfermero neonatal requiere un enfoque integral orientado a la

protección del desarrollo, seguridad del paciente y recuperación clínica del prematuro hospitalizado. La implementación de protocolos estandarizados y capacitación continua del personal favorecerá una atención neonatal más segura y humanizada.

Bibliografía

Ahmed, S., Hassan, M., Ali, R., & Ibrahim, N. (2025). Effect of neonatal positioning education program on nurses' performance and preterm infant comfort. Journal of Neonatal Nursing, 31(3), 144–151. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2025.01.008

Aita, M., De Clifford Faugère, G., Lavallée, A., Feeley, N., Stremler, R., Rioux, É., & Proulx, M. H. (2021). Effectiveness of interventions on early neurodevelopment of preterm infants: A systematic review and meta-analysis. BMC Pediatrics, 21, 210. https://doi.org/10.1186/s12887-021-02559-6

Alizadeh, S., Fallahi, M., & Kazemi, M. (2023). Effect of facilitated tucking during painful procedures on pain responses in premature infants: A randomized controlled trial. Journal of Neonatal Nursing, 29(5), 339–345. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2023.02.004

Altimier, L., & Phillips, R. M. (2022). The neonatal integrative developmental care model: Advanced clinical applications in NICU nursing. Newborn and Infant Nursing Reviews, 22(2), 79–86. https://doi.org/10.1053/j.nainr.2022.02.003

Bandyopadhyay, T., Maria, A., & Vallamkonda, N. (2023). Pre-feeding premature infant oral motor intervention (PIOMI) for transition from gavage to oral feeding: A randomised controlled trial. Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine, 16(2), 361–367. https://doi.org/10.3233/PRM-210132

Bembich, S., Cont, G., Causin, E., Paviotti, G., & Demarini, S. (2021). Neurodevelopmental outcomes after neonatal intensive care unit interventions: A systematic review. Children, 8(10), 914. https://doi.org/10.3390/children8100914

Bhandari, V., & Panigrahy, N. (2023). Evidence-based nursing interventions for neonatal intensive care: Current practices and future directions. Frontiers in Pediatrics, 11, 1184567.

https://doi.org/10.3389/fped.2023.1184567

Cakir, F., & Yildiz, S. (2022). The effect of facilitated tucking position on pain and physiological parameters in premature infants during invasive procedures. Journal of Pediatric Nursing, 62, e1--e7. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.11.020

Cakirli, M., Bayat, M., & Tekin, A. N. (2025). Effect of premature infant oral motor intervention (PIOMI) and pacifier intervention on the transition to oral feeding in preterm infants: A randomized controlled study. Japan Journal of Nursing Science, 22(2), e70009. https://doi.org/10.1111/jjns.70009

Cano, C., López, M., Fernández, M., & García, P. (2023). Nursing interventions for pain management in preterm infants undergoing invasive procedures: A systematic review. Journal of Pediatric Nursing, 71(131), 34–42. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.05.012

Coughlin, M., Gibbins, S., & Hoath, S. (2022). Developmental care in the neonatal intensive care unit: Evidence-based nursing practices. Advances in Neonatal Care, 22(4), 299–308. https://doi.org/10.1097/ANC.0000000000001016

Ecevit, A., Anuk-İnce, D., & Tarcan, A. (2023). Effect of nesting positioning on physiological stability and comfort in preterm infants: A randomized controlled trial. Journal of Perinatal Medicine, 51(5), 627–635. https://doi.org/10.1515/jpm-2022-0458

Firmino, C., Rodrigues, M., Franco, S., Ferreira, J., Simões, A. R., Castro, C., & Fernandes, J. B. (2022). Nursing interventions that promote sleep in preterm newborns in neonatal intensive care units: An integrative review. Healthcare, 10(9), 1694. https://doi.org/10.3390/healthcare10091694

Foster, J. P., Psaila, K., & Patterson, T. (2024). Developmental care interventions for preterm infants in neonatal intensive care units: A systematic review. Journal of Clinical Nursing, 33(7--8), 2456–2470. https://doi.org/10.1111/jocn.17053

Gao, L., Chen, Y., Wang, X., & Liu, J. (2025). Multisensory stimulation combined with nursing care improves oral feeding outcomes in preterm infants: A clinical study. BMC Pediatrics, 25, 112.

https://doi.org/10.1186/s12887-025-05211-7

Gao, Y., Chen, X., Wang, H., Li, J., & Zhang, Q. (2024). Effect of tactile-kinesthetic stimulation on growth and neurobehavioral outcomes in preterm infants: A randomized controlled trial. Frontiers in Pediatrics, 12, 1345271. https://doi.org/10.3389/fped.2024.1345271

Gao, Y., Zhang, Y., Li, X., Wang, J., & Chen, L. (2023). Effects of non-nutritive sucking combined with oral motor intervention on oral feeding outcomes in premature infants: A randomized controlled trial. BMC Pediatrics, 23, 507. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04276-6

Harding, C., Cockerill, H., & Koltowski, L. (2021). Neonatal nursing interventions to improve feeding outcomes in hospitalized infants. Journal of Neonatal Nursing, 27(5), 318–324. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2021.04.004

Héon, M., Bourgault, P., Gagnon, R., & De Clifford-Faugère, G. (2022). Comprehensive mapping of neonatal developmental care nursing interventions for preterm infants: A scoping review. BMJ Open, 12, e046807. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046807

Huang, L., Chen, Y., Li, X., Wang, J., & Zhang, H. (2024). Effect of developmental supportive care on sleep quality and physiological stability in premature infants: A randomized controlled trial. BMC Pediatrics, 24, 348. https://doi.org/10.1186/s12887-024-04732-3

Kaur, A., Kaur, G., & Singh, S. (2022). Effectiveness of kangaroo mother care on physiological parameters among preterm infants: A randomized controlled trial. Journal of Pediatric Nursing, 62, e39--e45. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.12.012

Kim, S. Y., & Kim, A. R. (2022). Attachment- and relationship-based interventions during NICU hospitalization for families with preterm/low-birth-weight infants: A systematic review of RCT data. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1126. https://doi.org/10.3390/ijerph19031126

Li, Y., Wang, X., Zhang, Y., Chen, L., Liu, J., & Huang, R. (2023). Effects of oral motor intervention on feeding performance and clinical outcomes in preterm infants: A

systematic review and meta-analysis. Frontiers in Pediatrics, 11, 1186076. https://doi.org/10.3389/fped.2023.1186076

Lin, T., Hu, J., Zhang, L., Qin, X., Liu, X., Lan, Y., Chen, K., & You, T. (2022). Promoting enteral tube feeding safety and performance in preterm infants: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 128, 104188. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104188

Liu, L., Oza, S., Hogan, D., Perin, J., Rudan, I., Lawn, J. E., Cousens, S., Mathers, C., & Black, R. E. (2021). Global, regional, and national causes of neonatal mortality: An updated systematic analysis. The Lancet Child & Adolescent Health, 5(5), 347–357. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00005-5

Lyu, T., Ye, R., Li, L. L., Zhang, L. L., Xiao, J., Ma, Y. L., & others. (2024). The effect of developmental care on the length of hospital stay and family centered care practice for very low birth weight infants in neonatal intensive care units: A cluster randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 156(104784), 1–22. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104784

Majoli, M., De Angelis, L. C., Panella, M., Calevo, M. G., Serveli, S., Knoll, B. L., & Ramenghi, L. A. (2023). Parent-administered oral stimulation in preterm infants: A randomized, controlled, open-label pilot study. American Journal of Perinatology, 40(8), 845–850. https://doi.org/10.1055/s-0041-1731452

Mirlashari, J., Fomani, F. K., & Khazaeipour, Z. (2022). Effect of nurse-led developmental care on physiological stability and behavioral responses in preterm infants hospitalized in neonatal intensive care units. Journal of Neonatal Nursing, 28(5), 328–334. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2022.03.006

Ota, K., Yoshida, Y., & Kato, T. (2023). Family-centered care interventions in neonatal intensive care units: A systematic review. BMC Pediatrics, 23, 456. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04213-7

Özdelikara, A., & Yılmaz, F. T. (2024). The effect of nesting positioning on physiological parameters and stress behaviors in preterm infants: A randomized controlled study. Journal of Pediatric Nursing, 76, 12–18.

https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.01.015

Park, S. J., Choi, H. J., & Lee, J. M. (2022). Nursing interventional studies on high-risk neonates in neonatal intensive care units: A systematic review. Iranian Journal of Neonatology, 13(2), 8–21. https://doi.org/10.22038/ijn.2022.60739.2156

Pimenta, H. P., Silva, A. A., & Carvalho, M. (2022). Non-invasive respiratory support strategies and nursing care for preterm infants in neonatal intensive care units: An integrative review. Revista Brasileira de Enfermagem, 75(6), e20210976. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0976

Purdy, I. B., Craig, J. W., & Zeanah, P. (2021). NICU nurses’ experiences and perspectives regarding developmental care practices for hospitalized neonates. Advances in Neonatal Care, 21(6), 425–433. https://doi.org/10.1097/ANC.0000000000000928

Raghu, S., Thomas, S., Kumar, V., & Mathew, J. (2025). Nurse-led developmental care interventions for preterm infants in neonatal intensive care units: A quality improvement study. Journal of Neonatal Nursing, 31(2), 88–95. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2024.11.006

Rohmah, I., Mukminin, M. A., Hasan, F., Romadlon, D. S., Chang, K.-M., Chen, K.-H., Widodo, A. F., & Chiu, H.-Y. (2025). Comparative effects of nonpharmacological interventions on sleep-wake states among preterm infants in neonatal intensive care units: a systematic review and network meta-analysis. Intensive & Critical Care Nursing, 91(104168), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2025.104168

Sadeghi, T., Rasouli, M., & Shabanian, G. (2024). Effect of neonatal massage therapy on growth and physiological responses of preterm infants: A systematic review and meta-analysis. BMC Pediatrics, 24(219), 1–19. https://doi.org/10.1186/s12887-024-04621-7

Sankar, M. J., Natarajan, C. K., Das, R. R., Agarwal, R., Chandrasekaran, A., & Paul, V. K. (2021). When and how to initiate enteral feeding in preterm neonates: Evidence-based nursing considerations. Journal of Perinatology, 41, 237–245. https://doi.org/10.1038/s41372-020-00828-5

Singh, P., Malshe, N., Kallimath, A., Garegrat, R., Verma, A., Nagar, N., Maheshwari, R., & Suryawanshi, P. (2023). Randomised controlled trial to compare the effect of PIOMI (structured) and routine oromotor (unstructured) stimulation in improving readiness for oral feeding in preterm neonates. Frontiers in Pediatrics, 11, 1296863. https://doi.org/10.3389/fped.2023.1296863

Song, J. T., Kinshella, M. L. W., Kawaza, K., & Goldfarb, D. M. (2023). Neonatal intensive care unit interventions to improve breastfeeding rates at discharge among preterm and low birth weight infants: A systematic review and meta-analysis. Breastfeeding Medicine, 18(2), 97–106. https://doi.org/10.1089/bfm.2022.0151

Soni, A., & Tsang, R. (2024). Nursing strategies for reducing neonatal intensive care complications: A systematic review. Journal of Neonatal Nursing, 30(2), 85–93. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2023.11.004

Tang, X., Sha, S., Jin, Q., & Lu, H. (2022). NICU Staff's Perceptions and Attitudes Toward the Family Integrated Care (FICare) Model: A Chinese Cross-sectional Study. Advances in Neonatal Care : Official Journal of the National Association of Neonatal Nurses, 22(5), 456–466. https://doi.org/10.1097/ANC.0000000000000939

Wardany, M., Hassan, A., El-Sayed, R., & Mahmoud, S. (2025). Facilitated tucking as a non-pharmacological intervention for pain management during invasive procedures in preterm infants: A randomized controlled trial. Journal of Neonatal Nursing, 31(2), 96–102. https://doi.org/10.1016/j.jnn.2024.10.006

Weng, Y., Zhang, J., & Chen, Z. (2024). Effect of non-pharmacological interventions on pain in preterm infants in the neonatal intensive care unit: A network meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Pediatrics, 24, 9. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04488-y

Yoshida, Y., Ota, K., & Kato, T. (2023). Developmental care interventions in neonatal intensive care units: A systematic review. BMC Pediatrics, 23, 456. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04213-7

Zhang, Q., Wang, Y., Li, H., & Chen, X. (2024). Effects of individualized developmental care on stress responses and

clinical outcomes in premature infants: A randomized controlled trial. Frontiers in Pediatrics, 12, 1365874. https://doi.org/10.3389/fped.2024.1365874

Zhang, Y., Duan, C., Cheng, L., & Li, H. (2023). Effects of massage therapy on preterm infants and their mothers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Pediatrics, 11, 1198730. https://doi.org/10.3389/fped.2023.1198730

Zhang, Y., Jiang, M., Wang, S., Xiang, X., He, W., Du, J., & Hei, M. (2024). Effect of family integrated care on stress in mothers of preterm infants: A multicenter cluster randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, 350, 304–312. https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.01.102